

الحلميات على أشجار الخوخ في لبنان. II. التغيرات الطارئة على كثافتها العددية وتوزيعها على أشجار الخوخ في منطقة بعلبك (البقاع).

علي بيـان

قسم العلوم الطبيعية، كلية العلوم، الجامعة اللبنانية،
بيروت، لبنان

الملخص

بيان، علي. 1989. الحلميات على أشجار الخوخ في لبنان. II. التغيرات الطارئة على كثافتها العددية وتوزيعها على أشجار الخوخ في منطقة بعلبك (البقاع). مجلة وقاية النبات العربية 7: 30-36.

عامل هام في خروج الحلميات من أماكن التشتية، وأن انخفاضها إلى ما دون الصفر في شهر تشرين الثاني / نوفمبر وسقوط الأوراق، مما عاملان محفزان لدخول الحلميات أماكن التشتية مرة أخرى، وإن انخفاض الرطوبة النسبية إلى ما دون 30% في الصيف، هو عامل سلبي لنمو وكثافة الحلميات رباعيات المخالف. ودل تحليل الارتباط واختبار «t» أن هناك ارتباطاً سلبياً ولكنه غير معنوي بدرجة احتمال 95% ما بين توزيع الحلم المفترس *Zetzellia talhouki* وكل من حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلم التيدي *Pronematinae* sp. وما بين الحلميات رباعيات الأرجل وكل من حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلم التيدي *Pronematinae* sp. في حين كان الارتباط إيجابياً ومعنواً ما بين الحلميات المفترسة من عائلة Phytoseiidae وكل من حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر بدرجة احتمال 98% والحلميات رباعيات الأرجل بدرجة احتمال 95%، وما بين *Zetzellia talhouki* والحلميات رباعيات *Pronema-tinae* sp. وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر بدرجة احتمال 98%. كلمات مفتاحية: خوخ، حلميات، عوامل بيئية، علاقات متبادلة بين الأنواع، لبنان.

درست التغيرات الطارئة على كثافة وتوزيع الحلميات على أشجار الخوخ في أحد الحقول في منطقة بعلبك (البقاع)، التي لا تستخدم فيها مبيدات، خلال آذار / مارس - تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986. ووجد أن أكثر الأنواع ترداً وأعلاها كثافة هي: حلم عفص براعم اللوز (*Acalitus phloeocoptes* (Nal.)) من عائلة «Eriophyidae»، وحلم الخوخ ذو الفكوك (*Diptacus gigantorhynchus* (Nal.)) من عائلة الطويلة (Diptacus gigantorhynchus (Nal.)) من عائلة Rhyncaphytoptidae»، وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر (*Eotetranychus carpini* (Oudm.)) من عائلة رباعيات Tydeidae» من عائلة Pronematinae sp.، و«Tydeidae» من عائلة *Typhlodromus* (Stigmaeidae) *Zetzellia talhouki* Dosse و *invectus* Chant (Phytoseiidae). ارتفعت كثافة حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر و *Pronematinae* sp. بشكل ملحوظ خلال أيام / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر، في حين أن كثافة وانتشار الحلميات رباعيات الأرجل قد انخفضت بدءاً من النصف الثاني من شهر آب / أغسطس، وحافظ النوعان المفترسان على درجة متوازنة نسبياً في توزيعهما وكثافتهما منذ أيار / مايو وحتى تشرين الأول / أكتوبر، وبلغت كثافتهما أعلى درجة في شهر حزيران. لقد وجد أن ارتفاع معدلات درجات الحرارة الدنيا إلى ما فوق 6°C خلال شهر نيسان / أبريل هو

طريق ومواد البحث

جمعت العينات من أوراق الخوخ في أكياس نايلون مثبتة بابرة رفيعة. بلغ حجم العينة 50 ورقة، أخذت عشوائياً من الأشجار، بمعدل 5 أوراق من كل شجرة، ثم عدت أفراد كل نوع أو عائلة (باستثناء الحلميات رباعيات الأرجل) باستخدام المجهر المجسم، وعدلت النتائج على أساس عدد الأفراد على 100 ورقة. كما حسبت النسبة المئوية للأوراق المصابة بكل نوع أو عائلة، بما في ذلك الحلميات رباعيات الأرجل.

المقدمة

تمت الإشارة في دراسات سابقة لكل من تلحق (6)، دوسي وموسى (4) وبيان (1) إلى أنواع الحلميات التي توجد على أشجار الخوخ في لبنان. وتتناول الدراسة الحالية التغيرات الطارئة على كثافة وتوزيع بعض الأنواع على أشجار الخوخ بمنطقة بعلبك (البقاع، لبنان، 1035 m فوق سطح البحر)، والعلاقات المتبادلة فيما بينها في الطبيعة، وتأثير العوامل البيئية المختلفة عليها.


وقد لوحظ التغيير في لون بالغات الحلم العنكبوتي ذو البقعتين من اللون الصيفي (أخضر أو أصفر) إلى اللون الشتوي (برتقالي أو بني) في 13 تشرين الأول / أكتوبر. ونظراً لكثافتهما المنخفضة فلم يتيسر تحديد عدد الأجيال لكل نوع خلال السنة. وقد ذكر دوسي (3) أن الحلم البني يعطي أربعة أجيال خلال السنة في تلك المنطقة.

شوهدت باللغات حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر لأول مرة على الأوراق في 20 نيسان / ابريل، وبقيت كثافة هذا الحلم منخفضة حتى قبل 13 تشرين الأول / أكتوبر (10 - 10 فرداً / 100 ورقة، شكل 1 جـ)، كذلك نسبة الأوراق المصابة (2 - 26 %) شكل 2 جـ، ثم ارتفعت هذه الكثافة بشكل مفاجئ إلى 950، 550 و 880 فرداً على 100 ورقة في 13 و 29 تشرين الأول / أكتوبر و 13 تشرين الثاني / نوفمبر، على التوالي، كما وصلت نسبة الأوراق المصابة في 13 تشرين الأول / أكتوبر إلى 56 % (شكل 2 جـ). وقد لوحظ تغير لون الاناث من الشكل الصيفي (أخضر مائل إلى الأصفر) إلى الشكل الشتوي (أصفر مذهب) في 29 تشرين الأول / أكتوبر. ويستدل من الشكلين 1 و 2 أن لهذا النوع 6 أجيال كاملة وجيل سابع غير كامل خلال السنة وأن هذه الأجيال متداخلة.

ولقد تراوحت متوسطات الدرجات الدنيا والقصوى للحرارة، والرطوبة النسبية، وفترة سطوع الشمس، خلال شهر آذار / مارس ما بين 3.5°C - 15.6°C ، و 54 - 91 %، و 7:30 - 7:30 م، و 44 - 79 % ساعة. ويلاحظ من تلك المتوسطات أنه لم يحدث تغير جوهري في فترة سطوع الشمس، كما وأن الرطوبة النسبية خلال الشهرين المذكورين كانت في الحدود المناسبة لنمو الحلميات، وأن التغير الجوهري قد حدث في درجات الحرارة التي ارتفعت إلى ما فوق 6°C . وهذا يوحي بأن الحرارة هي أهم العوامل المحددة لخروج باللغات الحلم العنكبوتي ذو البقعتين، والحلم البني، وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر، من أماكن التشتية.

من جهة أخرى لوحظ أن لفترة سطوع الشمس تأثيراً ملمساً في احداث التغيرات الفسيولوجية الازمة لتهيؤ حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلم العنكبوتي ذو البقعتين إلى الدخول في مرحلة البيات الشتوي (hibernation)، حيث كانت متوسطات درجات الحرارة والرطوبة النسبية خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر 9.7°C - 22.9°C ، على التوالي، وهي معدلات ملائمة للنمو. في حين كان متوسط فترة سطوع الشمس منخفضاً بشكل ملحوظ خلال الشهر نفسه ($7:20$ ساعة) ووصل إلى الصفر في اليومين الأول والثاني منه بسبب

والدراسة حلم عفص براعم اللوز أخذت العينات من الأغصان حديثة النمو، وبلغ حجم العينة 25 غصناً. عدّت العفصات على أطراف الأغصان بطول 5 - 7 سم، وعدلت النتائج على أساس كل من متوسط عدد العفصات على الغصن الواحد والنسبة المئوية للأغصان المصابة. واعتمد تحليل الارتباط واختبار « χ^2 » لتحديد العلاقة المتبادلة بين الحلميات على الأوراق. وتم الحصول على تسجيلات الحرارة، والرطوبة النسبية، وفترة سطوع الشمس، وهطول الأمطار من مركز البحث والتعليم في حوش سنيد، التابع للجامعة الاميركية في بيروت (حوالي 15 كم عن مكان الدراسة).



شكل 1. التغيرات الطارئة على كثافة الحلميات على أشجار الخوخ في منطقة بعلبك (الباقاع) خلال الفترة من آذار / مارس إلى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986 أ) دققيقات الملams، ذوات القدم الشعيرية، حلم كاليفورنيا التيدي، برونيماتوس اوبيكروتس، الحلميات البرغوثية. ب) الحلم البني، الحلم العنكبوتي ذو البقعتين. ج) حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر. د) حلم تيدي. ه) فيتوسيديات. و) ستسيلا تلحوقي.

Figure 1. Population fluctuations of mite density on plum trees in Baalbeck (Bekaa) throughout the period March – November, 1986. A) Tenuipalpidae; Tarsonemidae; *Orthotydeus californicus*; *Prognathus ubiquitus*; *Trombidiodea* spp.. B) *Bryobia rubrioculus*; *Tetranychus urticae*. C) *Eotetranychus carpini*. D) *Pronematinae* sp. E) *Phytoseiidae*. F) *Zetzelia talhouki*.

النتائج والمناقشة

1. رباعيات المخالف (Tetranychidae): الأنواع التي وجدت على الخوخ في منطقة بعلبك هي الحلم البني (*Bryobia rubrioculus* S.) والحلم العنكبوتي ذو البقعتين (*Tetranychus urticae* K.)، وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر (*Eotetranychus carpini* (Oudm.)). لوحظت باللغات الحلم البني والحلم العنكبوتي ذو البقعتين لأول مرة على الأوراق في 7 ايار / مايو وكانت كثافتهما وتوزيعهما منخفضين في جميع المشاهدات (0 - 20 فرداً / 100 ورقة، شكل 1 ب) و (0 - 10 %، شكل 2 ب) على التوالي.

gigantorhynchus كثافة ملحوظة في جميع المشاهدات، بما في ذلك خلال أشهر تموز / يوليو وآب / أغسطس وإيلول / سبتمبر الحارة ذات الرطوبة المنخفضة. وقد ارتفعت نسبة الأوراق المصابة بتلك الحلبيات من 62% في 7 أيار / مايو إلى 70% في 29 من الشهر ذاته، وبلغت النسبة ذروتها (92%) في 23 حزيران / يونيو، وبقيت الإصابة مرتفعة نسبياً حتى 19 آب / أغسطس ثم انخفضت إلى 5% في النصف الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر (شكل 2 ز)، باستثناء الارتفاع الطفيف لعدد حلم صدأ الخوخ الفضي وحلم أوراق الخوخ في 29 تشرين الأول / أكتوبر. ولقد لوحظت العقصات (galls) الناتجة عن حلم عفص براعم اللوز، والتي تعيش أفراده بداخلها، في 29 أيار / مايو، وارتفاع عددها ليصل إلى 12 و 14 عقصة على الغصين الواحد بطول 5 - 7 سم بين نهاية شهر حزيران / يونيو ونهاية شهر تموز / يوليو. وبدأ الانخفاض في عدد العقصات منذ 19 آب / أغسطس واستمر حتى تشرين الثاني / نوفمبر.

أما نسبة إصابة الغصينات فقد ارتفعت من 34% في 29 أيار / مايو إلى ما بين 80 - 100% في الفترات اللاحقة. وظهر الشكل 3 أن لهذا النوع أربعة أجيال كاملة وجيل غير كامل خلال السنة. وبدأ الجيل الأول من أيار / مايو حتى أواخر حزيران / يونيو، بينما يبدأ الثاني من الأسبوع الأول من شهر تموز / يوليو حتى الأسبوع الأول من شهر آب / أغسطس، وبدأ الثالث من الأسبوع الأول من شهر آب / أغسطس حتى الأسبوع الأول من شهر إيلول / سبتمبر، وبدأ الرابع من الأسبوع الأول من شهر إيلول / سبتمبر حتى متصرف شهر تشرين الأول / أكتوبر، أما الجيل الخامس غير الكامل فيبدأ من متصرف شهر تشرين الأول / أكتوبر حتى نهاية الموسم. وتوقفت فترة خروج هذا الحلم وأحداثه للإصابة في الربيع مع ما وجده تلحوق (6) عام 1963 على اللوز، حيث ذكر أن العقصات بدأت بال تكون في نهاية شهر أيار / مايو.

3. التيديات (Tydeidae) : كان وجود كل من حلم كاليفورنيا التيدي (*Orthotydeus californicus* (Banks)) و (*Pronematus ubiquitus* (McG.)) منخفضاً، ولم تتجاوز كثافة أي منهما 5 أفراد على 100 ورقة (شكل 1، آ). كما لم تتعدي نسبة الأوراق الملوثة بهما 5% (شكل 2، آ).

أما النوع غير المحدد *Pronematinae* sp فقد كانت كثافته منخفضة حتى أوائل شهر آب / أغسطس، ثم ارتفعت بشكل مفاجيء بعد ذلك لتصل إلى 160، 256، 512، 162 و 330 / 100 ورقة في 19 آب / أغسطس، 2 و 15 إيلول / سبتمبر، 1 و 13 تشرين الأول / أكتوبر، على التوالي، لتعود فتختخفض إلى 14 فرداً في 29 تشرين الأول / أكتوبر (شكل 1، د).

ذلك فإن توزيع هذا النوع كان مرتفعاً خلال أشهر آب /

الغيوم الكثيفة، وهطول الأمطار الغزيرة (شكل 4). ورغم ذلك فقد لوحظ الشكلان الصيفي والشتوي معاً، ولم يلاحظ دخول بالغات النوعين المذكورين إلى أماكن التشتهة، إلا في 17 تشرين الثاني / نوفمبر على أثر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، والتي وصلت إلى 1.5، 3، 2.5، 1 في 13، 14، 15، 16، على التوالي، من الشهر ذاته، ولم تتجاوز الدرجات القصوى 17° م. وقد أدى هذا الانخفاض إلى موت معظم الأطوار غير البالغة للحلبيات وكذلك إلى سقوط معظم الأوراق عن الأشجار. فإذا أخذنا بالاعتبار أن درجات الحرارة السائدة خلال الصيف هي دون المستوى الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالحلبيات، حيث كانت أعلى درجة حرارة 36° م (شكل 4)، في حين أن الدرجات المميتة لتلك الأنواع تتعدي 40° م (7)، وأن الرطوبة النسبية كانت منخفضة جداً وقدت في كثير من الأحيان إلى 28%， وهو انخفاض يمكن أن يؤثر سلبياً على النمو، بالإضافة إلى تقليل كفاءة الأوراق كمصدر غذائي نظراً لجفافها النسبي يمكن تفسير ارتفاع كثافة حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر المفاجيء في 13 تشرين الأول / أكتوبر، وذلك بعد حوالي عشرة أيام من هطول للأمطار، حيث بلغ معدل سقوط الأمطار في 2 تشرين الأول / أكتوبر 31 مم (شكل 4).

يستنتج مما سبق، الاحتمالات بأن ارتفاع درجات الحرارة في الربيع هي عامل رئيسي لخروج بالغات الحلم البني والحلم العنكبوتي ذو البقعتين وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر من أماكن التشتهة، وأن قصر فترة سطوع الشمس خلال شهر تشرين الأول / أكتوبر تحفز أفراد حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلم العنكبوتي ذو البقعتين على احداث التغيرات الفسيولوجية الضرورية للتهيؤ للدخول في مرحلة البيات الشتوي، كما أن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسقوط الأوراق خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر يشجعان بالغات هذين النوعين دخول أماكن التشتهة، وأن انخفاض معدلات الرطوبة خلال حزيران / يونيو وتموز / يوليو وآب / أغسطس وإيلول / سبتمبر ذات تأثير سلبي على نمو تلك الحلبيات، وانخفاض كثافتها العددية.

2. رباعيات الأرجل (Tetrapodili) : لوحظت الأنواع الثلاثة التي تصيب الأوراق وهي، حلم صدأ الخوخ الفضي (*Aculus fockeui* (Nal. and Trt.)), وحلم أوراق الخوخ المتجلول (*Phyllocoptes abaenus* Keifer)، وحلم أوراق الخوخ ذو الفكوك الطويلة (*Diptacus gigantorhynchus* (Nal.)) من الأسبوع الأول لشهر أيار / مايو وحتى سقوط الأوراق في تشرين الثاني / نوفمبر. وقد ساد النوعان *Aculus fockeui* و *Phyllocoptes abaenus* خلال أشهر أيار / مايو، وحزيران / يونيو، وتشرين الأول / أكتوبر، بينما سجل النوع *Diptacus*


6. لوحظ حلم التفاح المبطط ذو الشعر العريض *Cenopalpus*-*pus lanceolatisetae* (Attiah.) من عائلة *Tarsonemidae* و *Tarsonemus* sp. (Tenuipalpidae) ذوات القدم الشعرية (Tarsonemidae) والحلميات البرغوثية *Trombidioidea* spp. (Neophyllobiidae) (Neophyllobius sp.) وبكثافة وتوزيع منخفضين جداً (شكل 1a و 1b). أما النوع المفترس (Neophyllobiidae) فقد لوحظ في أشهر الخريف والشتاء، ولم يلاحظ خلال الربيع والصيف، مما يشير إلى أن هذا النوع من الحلم زائر وغير مرتبط بالخوخ وإنما يقضي الشتاء على شجرة الخوخ، لينتقل منها بعد ذلك في الربيع والصيف إلى عوائل نباتية وبيئات أخرى.

العلاقة المتبادلة بين الحلبيات على الخوخ: يشير الجدول 1 إلى ارتباط إيجابي بين الحلبيات الفيتوسيدية وجميع أنواع الحلبيات الأخرى. وقد جاء هذا الارتباط معنواً (Significant) مع كل من الحلبيات رباعيات الأرجل بدرجة احتمال $P = 95\%$ ، وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر بدرجة احتمال $P = 98\%$ ؛ ويدل هذا على أن زيادةإصابة أوراق الخوخ بالحلبيات رباعيات الأرجل وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر تؤدي إلى زيادة توزيع الحلبيات المفترسة من عائلة «Phytoseiidae». يستنتج كذلك على أن الحلبيات الفيتوسيدية لا تؤثر بدرجة سلبية ملحوظة على توزيع حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلبيات رباعيات الأرجل، ذلك أن الارتباط إيجابياً. إن ارتباط الحلم المفترس ستسيلا تلحوفي من عائلة «Stigmeidae» سلبي وغير معنوي بدرجة احتمال $P = 95\%$ مع كل من الحلبيات التيدية وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر، وإيجابي ومعنوي ويدرجه احتمال $P = 99\%$ مع الحلبيات رباعيات الأرجل. ويستخلص مما سبق أن هذا النوع المفترس يؤثر سلبياً على توزيع الحلبيات التيدية وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر على أوراق الخوخ، ويتأثر إيجابياً بارتفاع نسبة تلوث أوراق الخوخ بالحلبيات رباعيات الأرجل. وللحظ أيضاً أن الارتباط بين الحلبيات رباعيات الأرجل من ناحية، وكل من حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلبيات التيدية كان سلبياً وغير معنوي بدرجة احتمال $P = 95\%$ ، مما يوضح التنافس الغذائي والبيئي بين هذه المجموعة من الحلبيات. فارتفاع نسبة تلوث أوراق الخوخ بالحلبيات التيدية وحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر يخضع نسبة تلوثها بالحلبيات رباعيات الأرجل والعكس صحيح. أما الارتباط بين حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر والحلبيات التيدية فقد كان إيجابياً ومعنواً بدرجة احتمال $P = 98\%$ ، مما يشير إلى أن زيادة نسبة تلوث أوراق الخوخ بحلم كاريبي العنكبوتي الأصفر يحسن من زيادة توزيع الحلبيات التيدية. ولما كانت الحلبيات التيدية متعددة مصادر التغذية (اندرية عام 1986) (2)

اغسطس وأيلول / سبتمبر وتشرين الأول / أكتوبر (شكل 2، هـ) وتتجدر الاشارة إلى أنه قد وجد نوع رابع غير محدد تابع لهذه العائلة على الأغصان خلال أشهر آذار / مارس وتشرين الثاني / نوفمبر، ولم يلاحظ على الأوراق، مما يوحي بأنه غير مرتبط بالخوخ، ومن المحتمل أنه زائر يقضى فترة الشتاء على الخوخ، ثم ينتقل بعد ذلك في الربيع والصيف إلى مضيقات نباتية وبيئات أخرى.

4. الفيتوسيديات (Phytoseiidae) : كانت كثافة وتوزيع هذه الحلبيات ثابتة تقريباً من أشهر أيار / مايو وحتى تشنرين الثاني / نوفمبر. وقد كانت أعلى كثافة 124 فرداً على 100 ورقة في 23 حزيران / يونيو (شكل 1 هـ)، وكان أعلى توزيع لها في الفترة نفسها 68% (شكل 2 د). كان وجود النوعين *Amblyseius fin-* و *Phytosieus ocellatus* Bayan *landicus* Oudm. أعلى في شهر أيار / مايو وحزيران / يونيو وتشرين الأول / أكتوبر وتشرين الثاني / نوفمبر، في حين كان وجود النوع *Typhlodro-mus invictus* (Chant) عالياً في جميع المشاهدات، مما يجعله النوع الرئيس من هذه العائلة على الخوخ. أما النوع *Typhlodromus erezanicus* (Wainstein and Arutunjan) فلم يلاحظ إلا في شهر حزيران / يونيو فقط. ونشير هنا إلى أن عائلة الفيتوسيديات وتوزيع أنواعها خلال أشهر السنة يتغير تبعاً للظروف البيئية، وتتوفر المصادر الغذائية، وربما لأسباب أخرى غير معروفة. وتفق هذه الإشارة مع ما وجده راغوزا عام 1986 (5) من أن كثافة نوع معين من هذه العائلة تختلف من سنة لأخرى وعلى مدار الأشهر.


5. ستسيلا تلحوفي (Stigmeidae) *Zetzellia talhouki* Dosse: سجل هذا النوع على الأوراق في الأسبوع الأول من شهر أيار / مايو، وكانت كثافته متجانسة في جميع المشاهدات تقريباً، ولكن توزيعه على الأوراق كان منخفضاً مقارناً مع الفيتوسيديات. وبلغت كثافته ذورتها في 23 حزيران / يونيو (102 فرداً على 100 ورقة - شكل 1 هـ) وبلغ توزيعه: 26% (شكل 2 و). وفي نفس التاريخ (23 حزيران / يونيو) بلغت كثافة وتوزيع المفترسات من عائلة Phytoseiidae ذورتها. و يبدو أن الارتفاع في كثافة المفترسات قد تأثر إيجابياً بتوفير المصادر الغذائية بشكل ملحوظ خلال شهر حزيران / يونيو مماثلة في ارتفاع كثافة أنواع رباعيات الأرجل، ورباعيات المخالف، والتيديات. ولقد احتفى النوع *Z. talhouki* تقريباً من على الأوراق في نهاية شهر تشنرين الأول / أكتوبر، ولم تلاحظ في شهر تشنرين الثاني / نوفمبر إلا أفراد قليلة منه (شكل 1) و (شكل 2)، مما يشير إلى حساسيته لدرجات الحرارة المنخفضة، والتي حدثت في أواخر شهر تشنرين الأول / أكتوبر وخلال شهر تشنرين الثاني / نوفمبر (شكل 4).



شكل 2. التغيرات الطارئة على توزيع الحلميات على أشجار الخوخ في منطقة بعلبك (البقاع) خلال الفترة من آذار / مارس إلى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986.

آ) دقيقات الملامس، ذوات القدم الشعرية، حلم كاليفورنيا التيدي، برونيماتوس اوبيكوتوس، الحلميات البرغوثية. ب) الحلم البني، الحلم العنكبوتي ذو البعتين. ج) حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر. د) فيتوسيديات. هـ) حلم تيدي. و) ستسيلا تلحوقي. ز) رباعيات الأرجل.

Figure 2. Population fluctuations of mite abundance on plum trees in Baalbeck (Bekaa) throughout the period March – November, 1986. A) Tenupalpidae; Tarsonemidae; *Orthotydeus californicus*; *Prognathus ubiquitus*; Trombidiidae spp. B) *Bryobia rubiocolus*; *Tetranychus urticae*. C) *Eotetranychus carpini*. D) Phytoseiidae. E) Prognathinae sp. F) Tetrapodidae.



شكل 3. درجةإصابة غصينات الخوخ بحلم عفص براعم اللوز في بعلبك (البقاع)، خلال الفترة من آذار / مارس إلى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986. آ) متوسط عدد الفحصات على الغصين الواحد يطول 5 - 7 سم. ب) النسبة المئوية لإصابة الغصينات.

Figure 3. Degree of plum twigs infestation by *Acalitus phloeocoptes* (Nal.) (Eriophyidae), throughout the period March – November, 1986.

A) Mean No. of galls per twig (5 - 7 cm long), B) Percentage of infested twigs.

جدول 1. درجات الارتباط بين توزيع بعض الحلميات على أشجار الخوخ في منطقة بعلبك (البقاع) خلال الفترة من آذار / مارس إلى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986.

Table 1. Degree of correlation between the abundance of certain mite species on plum trees in Baalbeck (Bekaa) throughout the period March – November; 1986.

توزيع العشيرة Population abundance		Mites spp. ^a
t-value matrix	Correlation matrix	أنواع الحلميات، آ Correlation matrix
for $r < > 0$ with 15 df	قيمة t عند $r > > 0$ صفر و 15 دح	الارتباط $r > > 0$ صفر و 15 دح
		آ، آ، ب و ب، ج وجـ، د دـ، هـ وهـ،
99999	1 A&A; B &B; C & C; D & D; E & E	آ و ب
1.18353	0.29224	آ وجـ
1.42046	0.34437	آ و دـ
1.79943	0.42135	آ وجـ
2.9115	0.52533	آ وجـ
- 0.92831	- 0.23308	ب وجـ
4.13948	0.73022	ب و دـ
- 0.46026	- 0.11801	ب وهـ
- 0.62332	- 0.15889	جـ و دـ
2.37986	0.52353	جـ وهـ
- 1.18589	- 0.29277	د وهـ

a: A) Phytoseiidae; B) *Zetzellia talhouki*, C) Pronematinae sp.; D) Tetrapodidae spp.. E) *Eotetranychus carpini*.

آ: آ) حلميات فيتوسيدية، ب) ستسيلا تلحوقي، جـ) حلميات تيدية، دـ) حلميات رباعيات الأرجل، هـ) حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر.


لذا يعتقد أن العلاقة الإيجابية ناتجة من أن حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر يؤمن وسطاً بيئياً ملائماً للحلميات التيدية من خلال النسخ الحريري الذي يفرزه، وكذلك بتوفير مواد عضوية يمكن أن تتغذى عليها الحلميات التيدية. من جهة أخرى يبدو أن الحلميات التيدية التي تتغذى عليها المفترسات الفيتوسيدية والنوع *Zetzellia talhouki* تقلل من تعرض حلم كاريبي العنكبوتي الأصفر لهجومها مما ينعكس إيجابياً على توزيعه وكثافته.

دللت نتائج التحليل الاحصائي أيضاً إلى تطابق بين الارتباط في نسب التوزيع والارتباط بالنسبة إلى الكثافة، حيث أنه عند وجود ارتباط إيجابي ومعنوي بدرجة احتمال معينة بين مجموعتين من الحلميات، كان هناك أيضاً ارتباط إيجابي ومعنوي وبدرجة الاحتمال نفسها بالنسبة إلى كثافة المجموعتين المذكورتين، باستثناء العلاقة ما بين الحلميات المفترسة من

مما سبق أن كثافة المجموعتين متناسبة طردياً بينما لا تظهر هذه العلاقة في حالة التوزيع. ويعزى هذا إلى أن الحلميات الفيتوسيدية سريعة الحركة، كما وأن أناثها تتضاعف البيوض فرديةً وفي أماكن متفرقة، في حين أن النوع *Z. talhouki* بطيء الحركة جداً وتتضاعف أناثه البيوض كمجاميع في مستعمرات حلم كاربوني العنكبوتى الأصفر والحلميات التيدية، خاصة قرب العرق الوسطى للورقة وعند الروايا الناتجة عن تفرع العروق الثانوية عن العرق الوسطى.

شكر وتقدير

يتقدم المؤلف بالشكر لكل من الدكتور معين بعاصيري لمساعدته في الحصول على بعض المعلومات الضرورية لإنجاز هذا البحث، والدكتور سمير الشريف والدكتور عبد المنعم تلحوظ لمراجعةهما المقالة وابداء ملاحظاتها القيمة، وللأنسة فاطمة جمعة لمساعدتها في إجراء التحليل الاحصائي باستخدام الحاسوب الآلي في كلية العلوم الزراعية والغذائية بالجامعة الاميركية في بيروت. أتجز البحث بدعم من المجلس الوطني للبحوث العلمية، بيروت، لبنان.



شكل 4. درجات الحرارة (T) والرطوبة النسبية (RH) وفترة سطوع الشمس (S) وهطول الأمطار (R) في منطقة البقاع (حوش سنيد، 15 كم عن بعلبك). خلال الفترة من آذار/مارس إلى تشرين الثاني / نوفمبر عام 1986.

Figure 4. Temperature (T), Relative humidity (RH), Sunshine period (S) and Rainfall (R) in Bekaa (Hosh Snaid, 15 Km. of Baalbeck) throughout the period March – November, 1986.

عائلة Phytoseiidae والحلم المفترس ستسلا تلحوقي، حيث أن درجة الارتباط بالنسبة للكثافة كانت إيجابية ومعنى بدراجة احتمال $P = 95\%$ ، في حين أن الارتباط بالنسبة إلى التوزيع كان إيجابياً ولكن غير معنوي بدرجة الاحتمال نفسها. ويستدل

Abstract

Bayan, A. 1989. Mites on plums in Lebanon. II. Fluctuations of their population density and abundance on plum trees in Baalbeck (Bekaa). Arab J. Pl. Prot. 7:30 – 36.

A study on the fluctuations of population density of mites and their abundance was carried out during March – November, 1986 in a plum orchard nontreated with pesticides in Baalbeck (Bekaa). The most prevalent mites were: the almond gall budmite, *Acalitus Phloeocoptes* (Nal.) Eriophidae; the big-beaked plum mite, *Diptacus gigantorhynchus* (Nal.) (Rhyncaphytoptidae); the yellow spider mite, *Eotetranychus carpini* (Oudm.) (Tetranychidae); *Zetzellia talhouki* Dosse (Stigmaeidae), *Typhlodromus invictus* (Chant) (Phytoseiidae) and a tydeid mite, *Pronematinae* sp. The population density of the yellow spider mite and the tydeid, *Pronematinae* sp. increased significantly during September – October. The abundance of tetrapodilid mites started to decrease on the third week of August. The population density and abundance of the predators, *Zetzellia talhouki* and *Typhlodromous invictus* were relatively balanced during May – October and reached the peak at 23 June (more than 100 individuals /100 leaves). The rise of minimum temperature above 6°C in April was an important factor inducing

mites to leave their hibernation places and move on plum leaves. The decrease of temperatures below 0°C and the leaf-fall during November induced mites to move into overwintering niches, and the decrease of relative humidity below 30% during summer showed a negative effect on the development of tetranychid mites. It was found that there is a negative but not significant correlation at a probability of $P = 95\%$ between the abundance of: i) *Zetzellia talhouki* and both the yellow spider mite and *Pronematinae* sp. ii) the tetrapodilid mites and both the yellow spider mite and *Pronematinae* sp., whilst the correlation was positive and significant between the abundance of: i) phytoseiid mites and both tetrapodilids at $P = 95\%$, and the yellow spider mite at $P = 98\%$, ii) *Z. talhouki* and the tetrapodilids at $P = 99\%$, iii) tydeid mites *Pronematinae* sp. and the yellow spider mite at $P = 98$.

Key words: plums, mites, environmental factors, relationship between species, Lebanon.

References

- André, H.M. 1986. Notes on the ecology of corticolous epiphyte dwellers. 4. Actinedida (especially Tydeidae) and Gamasina (especially Phytoseiidae). Acarologia 27: 107 – 120.

المراجع

- بيان، علي. الحلميات على أشجار الخوخ في لبنان. I. مسح عام ومفتاح تشخيصي. مجلة وقاية النبات العربية 6 - 1:7

6. Talhouk, A.S.. 1963. *Aceria phloeoecoptes* (Nal.), a serious eriophyid pest of almond in Lebanon and Syria. AUB, Publ. No. 22: 1 – 8; Anz. Schadlingsk 36: 129 - - 132.
7. Van de Vrie, M., J.A. McMurtry and C.B. Huffaker. 1972. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies. III. Biology, ecology and pest-status, and host-plant relations of tetranychids. Hilgardia 41: 343 – 432.
3. Dosse, G. 1963. *Bryobia rubrioculus* Scheuten in der nord-lichen Bekaa des Libanons (Acarina: Tetranychidae). Z. Pflanzenkrankh. 70: 652 – 665.
4. Dosse, G. and S. Musa. 1967. Phytophagous mites in Lebanon and their predators. Magon, Inst, Res. Agr., Tel-Amara, Liban, Publ. No. 12: 1 – 23.
5. Ragusa, S.. 1986. A five – year study on population fluctuations of phytoseiid mites in a citrus orchard in Sicily. Acarologia 27: 93 – 201.